



我们社区的野生鸟类

正在减少-1

OHLONE HUMANE SOCIETY

你容易见到的一些 野鸟

野鸭

- 野鸭栖息于野外和城市的湖泊、河口、河流、咸水和淡水中。
- 野鸭喜欢吃蜗牛、蛞蝓、昆虫、蠕虫以及种子、根茎和植物。雄野鸭的头部为深绿色，喙为黄色，翅膀为棕色，有蓝色斑点，身体为灰色。雌性身体上有棕色斑点。
- 野鸭的寿命为 3-20 年，与配偶一起产蛋 8-13 枚。
- 小鸭子需要大约 2 个月的时间来学习飞行，但几乎从出生起就能飞了。
- 野鸭以 V 字形飞行，每年迁徙。
- 不幸的是，每年都有许多社区小鸭子成为孤儿，或者在暴雨排水沟中被发现。野生动物康复者可以提供帮助！




美洲乌鸦

- 美洲乌鸦遍布加拿大、墨西哥和美国。它们在野外的寿命为 7-8 年。
- 尽管有些乌鸦会在秋季迁徙，但它们一般都会在同一地区生活。乌鸦往往在夜间聚集成庞大的群体，从数百只到数百万只不等。
- 美洲乌鸦会飞，但也会在树上和地上行走寻找食物。它们吃各种植物和小动物。它们是巢穴捕食者，吃巢中的蛋。
- 美洲乌鸦往往终身交配，成对的乌鸦可能会组成一个大约 15 只乌鸦的家庭，在乌鸦能够离开巢穴后的几个月里，它们还要照顾幼鸟。
- 美洲乌鸦与蚂蚁有一种有趣的关系！它们趴在蚂蚁山上，让蚂蚁爬到翅膀上，清理翅膀，然后把蚂蚁甩掉。
- 美洲乌鸦非常聪明，它们可以使用杯子和棍子等工具探寻食物，并用水浸湿干粮。



安娜蜂鸟

- 
- 安娜蜂鸟是 300 种蜂鸟中的一种，生活在北美西海岸，以后院喂食器、花蜜、树液和昆虫为食。这种蜂鸟比其他北美蜂鸟吃更多的昆虫，因此它们可以选择在冬季花朵较少的地方迁徙。在采集花蜜的同时，它们也是授粉者。
 - 安娜蜂鸟交配后，母亲照顾幼鸟约两周，然后幼鸟离巢。离巢后，它们往往成对飞来飞去，通常是兄弟姐妹。
 - 安娜蜂鸟是蜂鸟家族中唯一的红头蜂鸟。
 - 安娜蜂鸟是树蛇、灌丛松鸦和红隼等的猎物。
 - 安娜蜂鸟的寿命约为 8-9 年，身长约 4 英寸。
 - 安娜蜂鸟和其他蜂鸟一样，是唯一能倒飞的鸟类。

家雀

- 美国各地甚至夏威夷都有家雀的踪迹！它最初来自墨西哥和美国南部各州，但在 20 世纪 40 年代被作为好莱坞雀在纽约销售。它们的销售被取缔后被放生，现在已成为常见的野生鸟类。
- 家雀吃谷物、种子和浆果、荨麻和蒲公英种子。它们会光顾后院的喂鸟器，尤其是那些装有向日葵种子的喂鸟器。
- 家雀能迅速筑巢，母雀抚养小家雀，公雀哺育小家雀。
- 雄性家雀的颜色会有所不同。雌鸟喜欢红头的雄鸟，但雄鸟的颜色会随着季节的变化而浓淡不一。它们的颜色来自于它们吃的浆果和水果，因此它们的颜色可能是浅黄色、橙色或红色。雌鸟大多为棕色。



如何为后院的野生鸟类创建栖息地

您能做什么

鸟类需要什么

雏鸟可能几乎没有羽毛，也不能很好地行走。

如果看到雏鸟出巢，请在附近的灌木丛或树上寻找巢穴。轻轻地将雏鸟送回巢中，让母亲在雏鸟回来后照顾它。

如果没有巢，可以将一个有软布衬里的小篮子挂在离地面较远的树上，观察一个小时，等鸟妈妈来取雏鸟。如果母鸟没有回来，请尽快联系野生动物康复人员。

如果雏鸟或幼鸟出现生病、受伤、虚弱和脱水等症状，请立即致电野生动物康复中心。

如果过了几个小时，就把它放在一个有气孔的纸箱里，并在箱子下面放一个加热垫保温。

不要喂食或试图喂食或给水。请联系康复中心以获得指导。

当雏鸟从巢中飞下来，但没有力气再飞上去时，常常会被误认为是受伤或生病的动物。这是鸟类发育的正常阶段。父母每隔15-30分钟就会在地面上喂它昆虫。如果您在地上看到一只小鸟，并看到一只成鸟在喂它，那么就不需要干预。

雏鸟可能会面临来自捕食者、狗、猫和人类的危险。

健康的雏鸟有可能在被移走后24小时内与父母团聚。

白天，将婴儿带到发现它的地方附近。找一个安全的地方，比如有灌木丛的地方，把它放在灌木丛下或低矮的树枝上。远远地观察，让父母感到安全。如果您观察到亲鸟在喂食雏鸟，说明它们已经团聚，但如果您在2小时内没有观察到亲鸟，请联系野生动物康复人员。



请记住，野生动物不是宠物。为了帮助做出对动物最有利的决定，请联系有执照且训练有素的野生动物康复师。他们的最终目标是帮助野生动物康复，让它们重返大自然。

小鸟： 有无帮助？ 何时联系野生动物康复者

怎么帮助： 巢

雏鸟可能几乎没有羽毛，也不能很好地行走。

如果看到雏鸟出巢，请在附近的灌木丛或树上寻找巢穴。轻轻地将雏鸟送回巢中，让母亲在雏鸟回来后照顾它。

如果没有巢，可以将一个有软布衬里的小篮子挂在离地面较远的树上，观察一个小时，等鸟妈妈来取雏鸟。如果母鸟没有回来，请尽快联系野生动物康复人员。

如果雏鸟或幼鸟出现生病、受伤、虚弱和脱水等症状，请立即致电野生动物康复中心。

如果过了几个小时，就把它放在一个有气孔的纸箱里，并在箱子下面放一个加热垫保温。

不要喂食或试图喂食或给水。请联系康复中心以获得指导。



儿童不应试图 营救野鸟、受 伤的鸟或幼 鸟。

成年人应联系 野生动物康复 机构以寻求建 议！

另见 [在 OHS 网站上 找到一只鸟宝 宝？](#)

请不要干预： 秧苗

当雏鸟从巢中飞下来，但没有力气再飞上去时，常常会被误认为是受伤或生病的动物。这是鸟类发育的正常阶段。父母每隔 15-30 分钟就会在地面上喂它昆虫。如果您在地上看到一只小鸟，并看到一只成鸟在喂它，那么就不需要干预。

雏鸟可能会面临来自捕食者、狗、猫和人类的危险。

健康的雏鸟有可能在被移走后 24 小时内与父母团聚。


白天，将婴儿带到发现它的地方附近。找一个安全的地方，比如有灌木丛的地方，把它放在灌木丛下或低矮的树枝上。远远地观察，让父母感到安全。如果您观察到亲鸟在喂食雏鸟，说明它们已经团聚，但如果您在 2 小时内没有观察到亲鸟，请联系野生动物康复人员。



请记住，野生动物不是宠物。为了帮助做出对动物最有利的决定，请联系有执照且训练有素的野生动物康复师。他们的最终目标是帮助野生动物康复，让它们重返大自然。



帮助鸭宝宝找到池塘和他的家人。



如果您发现一只孤儿或受伤的鸟，请致电野生动物康复专家



拯救我们的野生动物!



教育!

